

臺灣菸酒股份有限公司 99 年第 2 次從業人員（相當評價職位人員）甄試試題  
甄選職等／類別【代碼】：第 2 職等人員／護士【82411】

專業科目 1：護理學概要

\*請填寫入場通知書編號：\_\_\_\_\_

注意：①作答前須檢查答案卡、入場通知書編號、桌角號碼、應試類別是否相符，如有不同應立即請監試人員處理，否則不予計分。

②本試卷正反兩頁共 40 題，每題 2.5 分，限用 2B 鉛筆在「答案卡」上作答，請選出最適當答案，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

③本項測驗不得使用電子計算機。

④答案卡務必繳回，違反者該科成績以零分計算。

【4】1.有關替成年人測量血壓操作技能的敘述，下列何者正確？

- ①放氣每秒不超過 10 mmHg                      ②打氣至橈動脈消失時，應再打 10 mmHg 以防聽診隙  
③橡皮氣囊之下緣應放在肘關節上 3~4 吋                      ④每次打氣勿超過 10 mmHg

【1】2.曾先生上班時不慎跌倒，造成左前臂大範圍皮膚磨傷，護理人員應為他採用下列何種包紮方法較適當？

- ①螺旋回反形                      ② 8 字形                      ③人字形                      ④回反摺形

【3】3.下列何者是糖尿病患者平日自行注射胰島素所採用之方法？

- ①靜脈注射                      ②皮內注射                      ③皮下注射                      ④肌肉注射

【2】4.田小姐的身高 160 公分，體重 50 公斤，其身體質量指數（BMI）約為：

- ① 18.5                      ② 19.5                      ③ 20.5                      ④ 21.5

【3】5.愛滋病人體液污染桌椅、地板時，可以使用多少濃度的漂白水擦洗污染區域？

- ① 0.006%                      ② 0.06%                      ③ 0.6%                      ④ 6%

【4】6.癌症慢性疼痛病患達成最佳的疼痛控制方法為下列何項？

- ①忍耐，少用藥，以免成癮                      ②疼痛劇烈時才服藥  
③每日睡 12 小時以上，以阻斷疼痛                      ④採按時投藥方式，維持恆定的藥物濃度

【3】7.個案被施予 CPR 急救後，雖然恢復呼吸與心跳，但仍然意識不清，此時個案應該採取下列何種姿位？

- ①仰臥式                      ②半坐臥式                      ③側臥                      ④俯臥

【3】8.下列何者為膀胱癌最常見的症狀？

- ①頻尿                      ②排尿疼痛                      ③無痛性血尿                      ④尿量突然減少

【4】9.病人在輸血時突然出現寒顫與呼吸急促之症狀，此時護理人員最優先使用下列何項臨床處置？

- ①立刻通知醫師                      ②增加病人被蓋                      ③測量生命徵象                      ④馬上暫停輸血

【4】10.為接受核磁共振攝影患者所提供的護理指導內容，下列敘述何項正確？

- ①提醒病患在檢查前 8 小時，不可以吃東西  
②提醒病患在檢查前，應該喝約 2,000 c.c.的水分  
③檢查中，勿與病患說話，直到攝影完成為止  
④協助病患移除身上的金屬物品，如：項鍊、手錶、耳環、胸罩等

【2】11.婦女泌尿道感染最常見的菌種為：

- ①鏈球菌                      ②大腸桿菌                      ③白色念珠菌                      ④金黃色葡萄球菌

【4】12.為孕婦施行羊膜穿刺術檢查的主要目的是為其胎兒提供：

- ①血型、免疫的檢查                      ②心血管方面的檢測  
③成熟度的檢查                      ④染色體的檢查

【1】13.為婦女執行子宮頸抹片檢查時所應注意之相關事項，下列敘述何者正確？

- ①此婦女受檢前 24 小時內不應有性交行為  
②此婦女受檢前以溫水灌洗陰道可增加檢查精準度  
③安排此項檢查時間以卵巢週期的黃體期最合適  
④停經後的婦女可以不需再做此檢查

【3】14.護理人員替 2 個月的嬰兒肌肉注射時，最優先選擇的注射部位是：

- ①上臂三角肌                      ②背臀肌                      ③股外側肌                      ④腹臀肌

【4】15.有關注射流行性感疫苗的敘述，下列何者正確？

- ①只要打了疫苗，當年就不會被傳染  
②接種的最佳時機為每年 12 月底到 1 月底  
③建議 8 歲以下兒童注射 1 次，8 歲以上兒童則是注射 2 次  
④疫苗注射後 2~3 週才會產生免疫力

【3】16.行為治療最適合用於下列何種情況？

- ①調解家庭中複雜的婚姻問題                      ②改變憂鬱症患者悲觀的想法  
③訓練慢性精神病患的自我照顧能力                      ④改善精神分裂症患者的妄想症狀

【2】17.有關職業衛生護士對勞工健康檢查的安排及結果處理之敘述，下列何者正確？

- ①對年滿 40 歲以上的一般作業員工，應每三年安排一次健康檢查  
②對特殊檢查結果，屬第二級管理者，應請醫師註明其不適合從事之作業  
③對健康檢查異常員工，立即予以通知複診後結案  
④為了保護員工隱私，員工健康檢查結果不宜讓雇主知道

【4】18.護理人員從事家庭訪視的重點為何？

- ①預防重於治療                      ②早期發現、早期治療  
③限制殘障                      ④預防、治療、復健三者並重

【2】19.護理人員希望在中庄里舉辦團體衛生教育，工作進行的第一步是：

- ①設定教學目標                      ②評估民眾的需要和興趣  
③選擇合適的教育方法                      ④實施教育計畫

【2】20.針對臨終病患及其家屬所提供的護理措施，下列敘述何者錯誤？

- ①病患血液循環變慢，應給予適當的保暖  
②提醒家屬勿告知病患疾病預後及診斷  
③病患張口呼吸時，須給予口腔護理，以保持口腔清潔與濕潤  
④止痛藥的使用，以提供病患舒適為主，較不考慮副作用及成癮性

【2】21.下列哪些因素可能導致病患解出鮮紅色糞便？(A)直腸癌 (B)食道靜脈曲張 (C)十二指腸潰瘍 (D)食用過多甜菜根 (E)吃過多麻辣火鍋

- ① DE                      ② AD                      ③ BC                      ④ AB

【請接續背面】

【2】22.【情況】李先生 57 歲，124 公斤，因急性心肌梗塞到急診求治，醫師建議其住院接受冠狀動脈繞道手術治療。下列何者為測量李先生脈搏的理想部位？

- ①足背動脈                      ②心尖脈                      ③橈動脈                      ④股動脈

【4】23.承上題，李先生接受冠狀動脈繞道手術後，護理人員想了解其下肢末梢循環狀況時，應執行下列何種評估？ (A)雙下肢皮膚溫度 (B)肢端顏色 (C)肢端皮膚彈性 (D)觸診足背動脈 (E)下肢關節活動度

- ① ABC                      ② CDE                      ③ BDE                      ④ ABD

【3】24.心臟衰竭病患使用利尿劑（如：Lasix）的主要作用是為下列何者？

- ①增加前負荷                      ②增加後負荷                      ③降低前負荷                      ④降低後負荷

【2】25.有關靜脈輸注溶液之敘述，下列何者正確？

- ①肝功能異常病患最適合輸注乳酸鹽溶液                      ②林格氏液不能與輸血併用  
③顱內壓升高病患適合輸注 5%葡萄糖溶液                      ④高血壓及心臟病患須調慢滴速以預防空氣栓塞

【2】26.王先生 45 歲，公司安排健康檢查，初步結果為：(A)血壓 136/85mmHg、(B)心跳 90 bpm、(C)腰圍 95cm、(D)空腹血糖 105mg/dl、(E)三酸甘油酯 145mg/dl、(F) AST 52 IU/L，醫師告知王先生有代謝症候群的問題，請問哪些檢驗值異常與此問題有關？

- ① ABC                      ② ACD                      ③ BCE                      ④ CEF

【1】27.邱先生為腦下垂體腫瘤(Pituitary tumor)病患，今天施行經蝶鞍(trans-sphenoid)腫瘤切除手術，術後意識已清楚，雙側鼻孔鼻導管使用並用紗布條加壓中。您觀察到王先生的尿量連續三小時每小時均超過 300ml，醫生診斷其發生尿崩症，則下列何者可能為王先生之檢查結果？

- ①血清鈉 150mEq/L                      ②尿比重 1.030  
③血清滲透壓 280mOsm/L                      ④尿液滲透壓 500mOsm/L

【2】28.【情況】胡先生，68 歲，診斷為失智症，住院時常弄不清楚自己的病房與用餐時間，某日午餐時間，胡先生手持用過但尚未清洗的餐具與你在走廊相遇，卻開口問你：「護士小姐，我們什麼時候要吃飯？」。胡先生對於才用餐完畢的現象渾然不覺，是下列何種失智症的症狀所致？

- ①地點定向感障礙                      ②近期記憶缺失                      ③感覺知覺變異                      ④時間定向感障礙

【3】29.承上題，針對上述胡先生的症狀，護理人員對於胡先生的回應，下列何者最適當？

- ①「胡先生，你是不是肚子又餓了呢？」  
②「胡先生，你已經吃過飯了，為什麼還要問我這個問題呢？」  
③「胡先生，你已經吃過飯了，你看用過的餐具都還沒清洗。」  
④「胡先生，你真愛開玩笑，我明明就看到你在餐廳用餐，還這樣問我。」

【1】30.李先生與同事餐敘後，因為腹痛送入急診，經醫師診斷為急性膽囊炎，若要緩解其膽絞痛問題，下列何種藥物最適當？

- ① Meperidine                      ② Aspirin                      ③ Mefenamic acid                      ④ Morphine

【2】31.有關高血壓之危險因子控制，下列敘述何者錯誤？

- ①減輕體重維持正常的身體質量指數(BMI 值)  
②飲食多攝取蛋白質和高脂食物，少吸菸及酗酒  
③每日鈉總攝取量不超過 2.4 公克，即食鹽約 6 公克  
④每日進行溫和而持之以恆的有氧活動(如:慢跑)

【4】32.有關改良型乳房根除手術（modified radical mastectomy）後的護理指導，下列何者錯誤？

- ①患側手臂避免測量血壓                      ②教導義乳的購買及使用方法  
③須持續進行患側手臂復健運動                      ④患側手臂一年後就可執行任何工作

【1】33.病患疑似罹患急性心肌梗塞時，24 小時內的抽血可能會出現下列何項檢查結果？

- ①肌酸磷酸激酶（CPK）升高  
②血清乳酸脫氫酶濃度(LDH)下降  
③紅血球沉降速率（ESR）升高，嗜中性白血球計數降低  
④天門冬胺酸胺基轉移酶（AST）下降

【4】34.有關急性腎絲球腎炎病患少尿時的護理措施，下列何者錯誤？

- ①臥床休息                      ②採低鈉飲食  
③採高醣、低蛋白飲食                      ④增加鉀的攝取

【3】35.有關預防骨質疏鬆（osteoporosis）相關處置之敘述，下列何者錯誤？

- ①戒除菸酒及咖啡                      ②攝取適當維生素 D 以促進鈣質吸收  
③無負重運動較負重運動更能強壯骨骼                      ④停經後婦女，每日應攝取 1500mg 鈣質

【3】36.有關類風濕性關節炎（rheumatoid arthritis）之臨床表徵，下列何者正確？

- ①通常由骨盆關節開始侵犯                      ②症狀發生常呈現兩側不對稱  
③關節會產生持續進行性破壞                      ④受侵犯的關節越活動其僵硬情形越嚴重

【4】37.有關固定不動對身體造成的影響，下列敘述何者錯誤？

- ①因尿滯留及高血鈣現象，易有腎結石形成  
②因蛋白質的消耗量多於攝入量，易出現負氮平衡現象  
③因下肢血液留滯且自律性反應變差，易造成姿位性低血壓  
④因循環體液量減少且靜脈回流較差，易使心臟工作負荷減輕

【1】38.有關 B 型肝炎血清標記之敘述，下列何者錯誤？

- ① Anti-HBc IgG(+)表示目前其病毒在體內繁殖且具傳染性  
② HBeAg 只存在 HBsAg(+)的血清中，表示其具傳染力  
③ Anti-HBe 會在 HBsAg 消失後再出現，表示其傳染力減弱  
④ HBsAg(+)超過 6 個月且 Anti-HBs(-)時，則為帶原者

【4】39.海洛因依賴之病患，於其突然減用或停用海洛因時會出現戒斷症狀，如：瞳孔擴張、食慾不振、發抖等，請問其戒斷症狀於停用海洛因多久時會達到高峰？

- ① 3-6 小時                      ② 8-12 小時                      ③ 18-30 小時                      ④ 48-72 小時

【1】40.張太太 45 歲，經診斷為重度焦慮病患，張太太對其先生有強烈的恨意，卻不斷地告訴自己「我是最愛我先生的」，請問這是下列那一種防衛機轉之呈現？

- ①反向作用（reaction formation）                      ②抵消（undoing）  
③轉移（displacement）                      ④潛抑（repression）